

# Difesa e Nutrizione del Pomodoro



		Pre-trapianto	Post-trapianto	Prima fioritura	Allegagione	Inizio invaiatura	Maturazione
Crittogame	Peronospora, Batteriosi, Alternariosi, Septoriosi, Antracnosi		<i>KING</i> 250 g/hl / <i>MASTERCOP</i> 150 ml/hl		<i>KEEPER TRIPLO P.B.</i> 400 g/hl <i>RIFLE 4-24 R</i> 250-300 g/hl		<i>IDRORAME FLOW</i> 500 ml/hl
	Oidio				<i>TIOLENE 80 WG</i> 200-500 g/hl + <i>RADAR</i> 25-50 ml/hl o <i>SOLEIL 200 EC</i> 15-25 ml/hl / <i>RADAR COMBI SC</i> 170-340 ml/hl o <i>SOLEIL</i> 100-200 g/hl		
	Botrite				<i>PROMIX 26F</i> 160-200 ml/hl		
Insetti-nematodi	Nematodi ed Elateridi	<i>ETHOP</i> 4-5 ml/m <sup>2</sup>					
	Elateridi	<i>PIRIDANE</i> 10-15 kg/ha	+ effetto starter				
		<i>TEFLUSTAR</i> 40-50 kg/ha					
Insetti-nematodi	Afidi, Nottue fogliari, Aleurodidi, Dorifora			<i>DEMETRINA SE</i> 50-80 ml/hl / <i>METEOR</i> 60-90 ml/hl			
	Aleurodidi (neanidi)			<i>PIRIDANE EC</i> 0,8-1 l/ha / <i>CORONADO</i> 250-300 ml/hl			
				<i>CLAPS SC</i> 60 ml/hl / <i>OVISPRAY</i> 1-2,5 l/hl			
	Minatrici ( <i>Liriomyza</i> spp.)			<i>CIROGARD</i> 25-30 g/hl in serra, 30-40 g/hl in pieno campo, 1 kg/ha fertirrigazione			
Acari	Ragnetto rosso			<i>PICKER SC</i> 20 ml/hl (ovo-larvicida) / <i>RANDOM</i> 90 ml/hl (forme adulte)			
Diserbo	Diserbo totale	<i>GLIFENE SL</i> 3-5 l/ha					
	Graminacee e Dicotiledoni annuali	<i>DOXAR SC</i> 1-1,5 l/ha		<i>MAYA</i> 0,5-0,7 kg/ha (o 0,2-0,3 kg/ha frazionati)			
Nutrizione	Programma nutrizione	<i>FERTISTAR ZM+3E</i> Localizzato		<i>POWERGIZER</i> / <i>NUTRIGIZER</i> / <i>FERTIGIZER</i> (Trattamenti fogliari e/o Fertirrigazione)			
	Biostimolante, anti-stress, equilibratore nutrizionale			<i>SINERGIZER 15</i> / <i>ENERGIZER COMBI</i> / <i>AMINOMIX</i> / <i>AMINOZIME ULTRA</i> (Trattamenti fogliari e/o Fertirrigazione)			